


APICULTURA

Formación del apiario



Dra. María Alejandra Palacio

Unidad Integrada Balcarce (FCA-UNMdP-EEA-INTA)





Condiciones de una buena colmena

- ✓ Buena reina
- ✓ Bien poblada (6 a 8 marcos con cría de diferentes edades)
- ✓ Suficientes reservas de miel y polen
- ✓ Sanidad
- ✓ Material en buenas condiciones



Condiciones de un buen núcleo

- ✓ Reina joven y de buena calidad
- ✓ Cría de diferentes edades y huevos
- ✓ Reservas de miel y polen
- ✓ Bien poblada



Condiciones del paquete de abejas

- ✓ 1kg de abejas (cubren 4 marcos de cera estampada)
- ✓ Reina joven y de buena calidad
- ✓ Disponer de alimento



Condiciones del enjambre

- ✓ Buen tamaño
- ✓ Cambiar la reina por otra joven y de buena calidad



Adquisición de colmenas, núcleos o paquetes

Formación del apiario

Multiplicación propia

✓ **División de colmenas**

✓ **Formación de núcleos**

✓ **Formación de paquetes de abejas**



Adquisición de Colmenas pobladas

Ventajas

- ✓ Dan cosecha en la primera temporada
- ✓ Posibilidad de obtener un núcleo

Desventajas

- ✓ Inversión inmediata relativamente mayor
- ✓ Puede haber problemas sanitarios
- ✓ El material puede estar en mal estado
- ✓ Puede haber panales viejos, rotos y/o zánganeros



Adquisición de Núcleos

Ventajas

- ✓ Inversión relativamente menor que la compra de colmenas
- ✓ Se comienza con reinas nuevas
- ✓ Se puede comprobar rápidamente el estado sanitario
- ✓ Se puede controlar el desarrollo de la colonia desde el comienzo

Desventajas

- ✓ En la primera temporada la cosecha será menor
- ✓ No se podrá nuclear en la primera temporada
- ✓ Exige mayor atención que una colmena hasta alcanzar el desarrollo de la cámara de cría



Adquisición de Paquetes

Ventajas

- ✓ Requiere menor inversión económica que la colmena y el núcleo
- ✓ Puede adelantarse en 15 ó 20 días al núcleo hecho en la zona
- ✓ Disminuyen notablemente las manifestaciones de enfermedades larvales
- ✓ Facilita el control sanitario
- ✓ Produce igual o más que una colmena establecida



Desventajas

- ✓ Requiere más atención que un núcleo
- ✓ No es conveniente nuclearlo hasta después de la cosecha

